# Mode d'emploi du médicament BICIRKAN

## Dans quel cas le médicament BICIRKAN est-il prescrit ?

C'est un protecteur vasculaire et un veinotonique. Il facilite la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des vaisseaux capillaires.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique :

- des jambes lourdes, impatiences et autres troubles en rapport avec une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique,
- des crises d'hémorroïdes.

## Présentations du médicament BICIRKAN

**BICIRKAN** : comprimé (rose) ; boîte de 60

## Composition du médicament BICIRKAN

| | p cp |
|---|---|
| Petit houx, extrait sec | 80 mg |
| Hespéridine méthylchalcone | 200 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 400 mg |

Substances actives : Acide ascorbique, Fragon extrait sec, Hespéridine méthylchalcone
Excipients : Cellulose microcristalline, Citrate de triéthyle, Copovidone, Crospovidone, Éthylcellulose, Hypromellose, Magnésium stéarate, Rouge cochenille laque, Silice colloïdale anhydre, Talc, Titane dioxyde
Attention Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de phlébite chez les malades alités ou plâtrés.
Le traitement de l'insuffisance veineuse repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention.
Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des hémorroïdes et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.

## Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

## Mode d'emploi et posologie du médicament BICIRKAN

Ce médicament doit être pris avec un verre d'eau au début des repas.
Posologie usuelle :
1 comprimé le matin et 1 comprimé à midi.
Conseils
Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et lymphatique.
La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'hémorroïdes. Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.

## Effets indésirables possibles du médicament BICIRKAN

Diarrhée, parfois importante, nécessitant l'arrêt du traitement.
Nausées, douleurs d'estomac.
Rarement : éruption cutanée.

**Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.**

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

**Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.**